

## CONSEILS POST-OPÉRATOIRES SUITE À UNE APECTOMIE

---

Appliquer de la glace vis-à-vis de la dent traitée durant les 12 heures suivant l'intervention.

Il pourrait y avoir de l'enflure au niveau de la gencive, de la lèvre ou de la joue. Cette enflure est normale et atteindra son maximum après 48 heures. Elle diminuera ensuite au bout de 3 à 6 jours.

La salive pourrait être teintée de rouge pour les 2 ou 3 premiers jours. Cela est normal.

Le fait de fumer ralentit la guérison, évitez donc de le faire aussi longtemps que vous le pouvez.

Les sutures sont résorbables (fondantes) elles tomberont d'elles-mêmes après un mois . Cependant nous préférons vous revoir en visite de contrôle dans 10 à 14 jours, afin de les enlever.

Évitez d'étirer les lèvres ou le site de la chirurgie pour observer la dent, cela pourrait briser les sutures.

S'il y a douleur ou inconfort cela disparaîtra complètement après 2 semaines.

Des analgésiques extra-fort (genre Tylenol) devraient suffire à votre confort post-opératoire.

Une diète molle est préférable durant la première semaine.

Évitez de brosser les dents ou de rincer trop vigoureusement.

### RECOMMANDATIONS SPÉCIALES :

---

---

 Dr Jacques Vaillancourt

 Dre Nadia Fournier

---

[www.dentistevaillancourt.com](http://www.dentistevaillancourt.com)



dentiste@dentistevaillancourt.com



dentiste vaillancourt et fournier

73 rue de l'Église, Windsor, Qc, J1S 2A5



819-845-3080



819-845-7854