

Lambeau replacé apicalement (LRA) Dans quel cas cette chirurgie est-elle nécessaire ?

Au cours de la [maladie parodontale](#) certaines lésions, trop profondes ou trop difficiles d'accès ne peuvent être traitées par la seule réalisation de la thérapeutique initiale : motivation et enseignement à [l'hygiène bucco- dentaire](#), [détartrage](#) et [surfaçage radiculaire](#). Dans ces cas, l'élévation chirurgicale d'un lambeau permettra d'avoir un accès direct aux lésions avec un contrôle visuel sur les tissus à assainir.

Soins post-opératoire

Une poche de glace devra être appliquée sur le site opératoire pendant les heures suivant l'intervention afin de minimiser l'œdème.

Prendre la médication telle que prescrite.

Le [brossage](#), le passage des brossettes interdentaires et du fil dentaire au niveau du site opératoire devront être suspendus jusqu'à ce que les points soient retirés.

L'hygiène sera maintenue par la réalisation de bains de bouche à base de [chlorhexidine](#) ou d'un autre rince-bouche, cela après chaque repas et l'application sur les sutures d'un gel contenant de la chlorhexidine.

L'enlèvement des points s'effectuera après 7 à 10 jours de cicatrisation.

RECOMMANDATIONS SPÉCIALES :

 Dr Jacques Vaillancourt

 Dre Nadia Fournier

www.dentistevaillancourt.com



dentiste@dentistevaillancourt.com



dentiste vaillancourt et fournier

73 rue de l'Église, Windsor, Qc, J1S 2A5



819-845-3080



819-845-7854